

10 TANDA AMARAN

PENYAKIT IMUNODEFISIENSI PRIMER

Penyakit Imunodefisiensi Primer (PI) menyebabkan kanak-kanak dan orang dewasa berisiko mendapat jangkitan yang berulang dan sukar untuk sembuh. 1 dalam setiap 500 orang mengidap salah satu Penyakit Imunodefisiensi primer. Sekiranya anda atau seseorang yang anda kenali mempunyai 2 atau lebih tanda-tanda amaran berikut, beritahu doktor tentang kemungkinan Imunodefisiensi Primer sebagai penyebabnya.



1 Empat atau lebih jangkitan telinga baharu dalam tempoh setahun

2

Dua atau lebih jangkitan sinus yang serius dalam tempoh setahun



3 Penggunaan antibiotik selama dua bulan atau lebih tanpa kesan sembuh

4

Dua atau lebih jangkitan paru-paru dalam tempoh setahun



Kementerian
Kesihatan
Malaysia



Agenda Nasional
Malaysia Sihat



myhealthkkm



sihatmilikku



SCAN ME

10 TANDA AMARAN

PENYAKIT IMUNODEFISIENSI PRIMER



Berat badan tidak naik atau tumbesaran terbantut pada bayi

5

6

Bengkak bernanah yang berulang pada kulit atau organ badan



Jangkitan kulat berterusan dalam mulut atau pada kulit

7

8

Perlu antibiotik secara intravena untuk merawat jangkitan



Dua atau lebih jangkitan dalaman termasuk jangkitan dalam darah

9

10

Sejarah keluarga dengan imunodefisiensi primer



Kementerian
Kesihatan
Malaysia



Agenda Nasional
Malaysia Sihat



myhealthkkm



sihatmilikku



SCAN ME