



JENIS RAWATAN UNTUK IMUNODEFISIENSI PRIMER

1/2

Terapi Penggantian Intravena Immunoglobulin (IVIG)

1

IVIG diberikan melalui urat vena oleh profesional penjagaan kesihatan setiap 3-4 minggu pada dos yang ditentukan oleh doktor.

2

Kateter pusat tidak disyorkan kerana risiko jangkitan dan pembekuan darah. Luan subkutan boleh digunakan sebaliknya.

3

IVIG boleh diberikan dalam pelbagai ketetapan, tetapi infusi sendiri perlu dilakukan dengan kehadiran profesional perubatan kerana risiko kesan sampingan yang serius.

Sumber: MyPOPI | Tarikh kemaskini: 14 April 2023



JENIS RAWATAN UNTUK IMUNODEFISIENSI PRIMER

Terapi Penggantian Subkutaneus Immunoglobulin (SCIG)

SCIG diberikan di bawah kulit pada satu atau beberapa tapak, bergantung kepada jumlah yang diserap.

1

2

Dos dikira berdasarkan selang antara infusi, dan ia boleh dibuat setiap hari, mingguan, atau setiap dua hingga empat minggu.

3

Dos diselaraskan untuk mengurangkan jangkitan, dan tahap IgG dipantau untuk dikaitkan dengan hasil klinikal.

Sumber: MyPOPI | Tarikh kemaskini: 14 April 2023

